Grandes Cultures

Champagne-Ardenne

Bulletin n°381 du 5/11/97 : 1 page

d'après les observations du 03/11/1997

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINÇONNET - CFPPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776

DRAF - Service Régional de la Protection des Végétaux
Centre de Recherches Agronomiques
2, esplanade Roland Garros - BP 234 - 51686 REIMS CEDEX 2
Tél. 03 26 77 36 40 - Fax 03 26 77 36 74

TARIF COURRIER 380 F - FAX 430 F - PAGE 1


Agrométéo

Les basses températures et l'absence de pluie des jours derniers ont été défavorables au développement végétatif des cultures. Les stades n'ont pas bougé. Les colzas peuvent présenter des feuilles ramollies suite aux gelées et les blés des teintes gris rouge à cause du froid.

Colza

Stade :7 à 11 feuilles étalées.

Charançons du bourgeon terminal



Les températures fraîches ont limité le vol. Un seul charançon a été capturé à Bar sur Seine (Aube). Ailleurs, le piégeage est nul. Aucune ponte n'a été observée dans notre réseau.

Pucerons

Ils sont encore là dans les témoins non traités. Toutefois, les populations ont ont peu évolué. Généralement, dans les parcelles traitées, ils restent peu nombreux.

% de pieds touchés par les pucerons le 3 novembre

Lieu	témoin	traité
08 Le Thour	12	0
Mont-Laurent	100	0
Monthois	56	0
10 Balignicourt	92	16
Maisons les S.	100	0
Arrentières	55	33
Montmartin le Haut	100	-
Montaulin	48	8
Ville sur Arce	25	0
St Pouange	100	-
Pavillon St Julie	100	-
Villemaur	68	-
51 La Cheppe	16	0
Crugny	20	-
Vauchamps	100	-
Sompuis	100	8
Les Rivières Henruel	100	20
Marson	96	12

■ ***Effectuez les derniers traitements contre le charançon du bourgeon terminal dans les parcelles non encore protégées. Ne traitez plus spécifiquement les pucerons.***

Maladies

De nombreuses taches d'**oïdium** et quelques rares taches de **phoma** sont visibles sur les feuilles. Leur développement ne présente aujourd'hui aucun danger.

Céréales

Levée à 3 feuilles.

Limaces

Peu actives, elles pourraient le devenir avec le retour des pluies.

■ ***Surveillez les céréales n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles à l'aide de pièges et traitez dès les premières captures.***

Cicadelles

Malgré le froid, les populations restent nombreuses dans les parcelles de repousses. Dans l'Aube, en terre colorée, compte tenu de la présence du virus, le risque persiste. De plus, les températures augmentent. Partout ailleurs, aucun virus n'a été détecté.

Pucerons

Le vol de *Rhopalosiphum padi* est nul à notre tour. Dans les parcelles, les infestations ont peu évolué et sont généralement inférieures à 10% des pieds porteurs. Les résultats des pots pièges montrent des taux d'infestation et d'infection toujours faibles. Le pouvoir virulifère des pucerons reste peu important.

■ ***Traitez les pucerons si le seuil de 10% de pieds porteurs est atteint ou si les populations proches du seuil séjournent depuis plus de 10 jours dans les parcelles. Contre les cicadelles, un renouvellement de la protection est à envisager dans les terres colorées de l'Aube s'il y a un retour d'activité dans les parcelles non traitées GAUCHO dès le stade 1 feuille ou dans les parcelles traitées il y a 15 jours.***



Prochain bulletin le 19 novembre.
Venez nous rejoindre le 15 novembre à la journée Portes ouvertes "Qualité et sécurité de vos aliments" au Halle de l'Hotel de ville deTroyes de 8h à 16h en compagnie des Services Vétérinaires.



Colza : dernières interventions contre le charançon.

Céréales : traitez les pucerons si 10% des pieds sont porteurs ou si les populations proches du seuil séjournent depuis plus de 10 jours. Traitez les cicadelles en cas de retour d'activité dans les terres colorées de l'Aube.



